



Białobrzegi 07.01.2025 r.

EPN.NZC.9011.003.2025

**Dyrektorzy placówek szkolno-wychowawczych,
opiekuńczo-wychowawczych**

- wszyscy na terenie powiatu białobrzесьkiego –

W związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na poliomyelitis spowodowanego rosnącą liczbą detekcji wirusa polio typu 2 pochodzenia szczepionkowego w ściekach oraz potrzebą wzmożonych działań prewencyjnych oraz nadzorowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach wnosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz przekazanie ich za pośrednictwem systemów teleinformatycznych rodzicom dzieci uczęszczających do Państwa placówki.

1. Poliomyelitis (dawniej nagminne porażenie dziecięce lub choroba Heinego-Medina) to ostra choroba zakaźna wywołwana przez trzy typy polio wirusów – 1, 2 oraz 3. Nie różnią się one zjadliwością. Jednak ochronę przed zachorowaniem umożliwia uodpornienie przeciwko konkretnemu typowi wirusa, atakującego organizm. Zakażenia polio wirusami mają różnorodny przebieg: od bezobjawowych, łagodnych, poprzez zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, aż do ciężkich zachorowań porażennych.

Od wielu lat Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prowadzi ogólnoswiatowy program eradykacji poliomyelitis. Masowe szczepienia przeciw poliomyelitis, prowadzone w ramach tego programu, doprowadziły w krótkim czasie do radykalnego spadku liczby zachorowań, szczególnie w Europie, Ameryce Północnej, Japonii i Australii. Na całym świecie nadal prowadzi się szczepienia przeciw poliomyelitis, pomimo osiągnięcia sytuacji bliskiej wykorzenienia tej choroby.

2. W Polsce zgodnie z kalendarzem szczepień, wszystkie dzieci są szczepione przeciw poliomyelitis od połowy lat 50. ubiegłego wieku. Dlatego zakłada się, że większość osób dorosłych mieszkających w Polsce jest chroniona przeciw poliomyelitis. Dorośli, o których wiadomo lub podejrzewa się, że nie byli zaszczepieni lub są nie w pełni zaszczepieni przeciwko polio, powinni otrzymać uzupełniające szczepienia przeciwko poliomyelitis. Pełny cykl szczepień dla nieszczepionych dorosłych obejmuje trzy dawki szczepionki inaktywowanej przeciwko polio (IPV). Dorośli, którzy zostali zaszczepieni przeciwko poliomyelitis, ale są narażeni na zwiększone ryzyko, mogą przyjąć jedną dawkę przypominającą IPV co 10 lat.

Do tej grupy należeć mogą:

- podróżni udający się do krajów, w których polio występuje endemicznie (Afganistan i Pakistan) lub aktualnie dotkniętych epidemią polio (niektóre kraje Afryki i Azji),
- pracownicy laboratoriów i pracownicy sektora opieki zdrowotnej, którzy mają do czynienia z próbkami mogącymi zawierać wirusy polio,
- pracownicy sektora opieki zdrowotnej lub opiekunowie mający bliski kontakt z osobą, która może być zakażona wirusem polio,
- pracownicy oczyszczalni ścieków.

3. Występowanie wirusa w ściekach świadczy o czasowym lub długotrwałym pobycie w naszym regionie osób, które są nosicielami wirusa szczepionkowego stosowanego w żywych szczepionkach (OPV).

Szczepionki żywe (OPV) w Polsce nie są stosowane od 8 lat, co oznacza, że głównym źródłem mogą być obywatele tych krajów, gdzie szczepionka żywa jest nadal stosowana.

4. W związku ze wzrastającym ryzykiem wystąpienia zakażeń oraz objawowych zachorowań u osób nieszczepionych przeciwko poliomyelitis szczególną uwagę należy poświęcić na szczepienia dzieci, u których nie zostały one zrealizowane lub są zrealizowane w niepełnym zakresie. Należy również pamiętać o osobach dorosłych, które w dzieciństwie nie zrealizowały pełnego cyklu szczepień lub nie mają wiedzy o stanie zaszczepienia przeciwko polio. Szczególnie tych, którzy planują podróż w regiony gdzie występuje poliomyelitis.

Należy podkreślić, że dotychczas nie stwierdzono zakażeń objawowych poliomyelitis w Polsce, a odsetek zaszczepionych dzieci, mimo działań ruchów antyszczepionkowych jest nadal jednym z najwyższych w Europie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach apeluje do rodziców i opiekunów dzieci, które dotychczas nie zostały zaszczepione lub nie ukończyły pełnego cyklu szczepień przeciw poliomyelitis, o uzupełnienie brakujących szczepień.

Szczepienie jest nieodpłatne dla wszystkich osób do 19. roku życia.

Szczepienia wykonywane są przy użyciu szczepionki inaktywowanej (IPV), która jest skuteczna i bezpieczna.

Załącznik:

1. Sytuacja epidemiologiczna Polio.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białobrzegach**

Kamila Jagiello

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Anna Chyc